



AJOS Y CEBOLLAS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Almácigo	Estimula la resistencia a caída de almacigos	FOSFIMAX 40-20	300 cc/100 L	Aplicar en forma preventiva, repetir a los 7-10 días.
	Control de hongos y bacterias	MASTERCOP	100 cc/100 L	
	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	300 cc/100 L	Aplicar cada 7 días
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	600 a 800 cc/100 L	Inmersión de raíces
Transplante y establecimiento	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	300 cc/100 L	Aplicar 7 días post transplante y repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	500 cc/100 L	En riego por cintas: 10 L/Ha
Desarrollo vegetativo	Estimula la resistencia a Mildiú	FOSFIMAX 40-20	2 a 4 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Mildiú	KENDAL	3 a 4 L/ha	Sistemía ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Control de mildiú y botrytis	MASTERCOP	0,75 a 1 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad, repetir a los 7 días.
	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 a 3 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
	Firmeza de bulbos	DEFENDER BORO	2 L/Ha	
	Llenado de bulbos	DEFENDER POTASIO	3 L/Ha	

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.