



# BRASSICAS

## PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Almácigo	Estimula la resistencia a caída de almácigos	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	300 cc/100 L	Aplicar en forma preventiva, repetir a los 7-10 días
	Control de hongos y bacterias	<b>MASTERCOP</b>	100 cc/100 L	
	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	300 cc/100 L	Aplicar cada 7 días
	Crecimiento de Raíces	<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	600 - 800 cc/100 L	Inmersión de raíces
Transplante y establecimiento	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	300 cc/100 L	Aplicar 7 días post transplante y repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de Raíces	<b>ZOBERAMINOL RADICULAR</b>	500 cc/100 L	En riego por cintas: 10 L/Ha
Desarrollo vegetativo	Estimula la resistencia a Falso Oídio y Caída de Plantas.	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	2 - 4 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Control de Hongos y Erwinia sp.	<b>MASTERCOP</b>	0,75 a 1 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad, repetir a los 7 días
	Estimula la resistencia a la Erwinia	<b>KENDAL</b>	2 - 3 L/ha	Sistemia ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas
	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	2 - 3 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
	Firmeza de la inflorescencia	<b>DEFENDER BORO</b>	2 L/ha	
	Firmeza de la inflorescencia	<b>DEFENDER CALCIO</b>	2 L/ha	

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.