



CEREZOS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Huertos en formación	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	300 cc/100 L	Aplicar con brote de 20 cm. Repetir cada 10 a 15 días
	Crecimiento de Raíces	BIORADICANTE	10 L/ha	Aplicar vía riego con actividad radicular.
		ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
Yema hinchada	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	También en elongación de amento, flor pistilada y fruto en crecimiento.
Puntas Verdes	Correccion nutricional	DEFENDER ZINC	0,5 L/ha	
	Control de pseudomona sp.	MASTERCOP	1 - 1,5 L/ha	Repetir cada 10 días. Epoca muy sensible a la enfermedad.
Boton blanco	Mejorar calidad de frutos	DEFENDER CALCIO	3 - 4 L/ha	
	Correccion nutricional	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	
	Crecimiento de raices	BIORADICANTE	10 - 15 L/ha	Aplicar vía riego, junto al inicio de crecimiento de raices
		ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	Aplicar con 50 y 100 % flor.
50 % Flor	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	3 - 4 L/ha	Aplicar cada 7 días. Se puede aplicar junto a DEFENDER BORO
100 % Flor	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	2 - 4 L/ha	
Cuaja	Potenciar cuajado de frutos	FRUTALIV	2 - 4 L/ha	
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	2 - 4 L/ha	
	Correccion nutricional	DEFENDER ZINC	0,75 a 1 L/ha	
Caída de chaqueta	Calibre de fruta	CITOGROWER	1,5 - 2 L/ha	Compatible con vitalem, defender calcio y defender boro.
		VITALEM FORTE	3 - 4,5 L/ha	
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	3 - 4 L/ha	
		DEFENDER BORO	0,8 - 1 L/ha	

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.



CEREZOS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Caida de chaqueta (7 días después)	Calibre de fruta	CITOGROWER	1,5 - 2 L/ha	Compatible con defender calcio y defender boro.
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	3 - 4 L/ha	
		DEFENDER BORO	0,8 - 1 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40 - 20	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
Endurecimiento de carozo	Calibre de fruta	VITALEM FORTE	3 - 4,5 L/ha	
	Mejorar calidad de frutos.	DEFENDER CALCIO	3 - 4 L/ha	
	Aporte de Magnesio	DEFENDER Mg	2 - 4 L/ha	Aplicar en desarrollo de brotes, 2 a 3 aplicaciones.
Endurecimiento de carozo (7 días después)	Bioestimulación general	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR o ZOBERAMINOL 80 sp	300 cc/100 L 0,5 L/ha	Opcional para huertos con estrés o mejorar calidad de plantas. Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo con follaje activo.
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40 - 20	3 - 4 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
Pinta	Corrección nutricional	DEFENDER POTASIO	3 - 4 L/ha	Aplicar a inicio de cambio de color 2 a 3 veces, cada 7 días
		DEFENDER Zn	0,75 - 1 L/ha	
Crecimiento de frutos	Corrección nutricional	DEFENDER POTASIO	3 - 4 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40-20	3 - 6 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones.
	Mejorar calidad de poscosecha de fruta.	KENDAL	3 - 5 L/ha	Aplicar 14 y 7 días antes de la cosecha. Reduce la degradación de tejidos. Elicitación de fruta
Post cosecha	Corrección nutricional	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	Aplicar con hoja activa, mojando bien todo el follaje.
		DEFENDER ZINC	1 L/ha	
	Mejorar calidad de plantas y conducción vascular	FOSFIMAX 40-20	3 - 6 L/ha	Especialmente indicado en huertos con phytophthora y otras afecciones. Repetir a los 15 días.
	Estimular crecimiento de raíces	BIORADICANTE	10 - 15 L/ha	Aplicar via riego.
	Crecimiento de raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
	Control de pseudomonas spp.	MASTERCOP	1 - 1,5 L/ha	Repetir a los 7 a 10 días.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.



CEREZOS

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Caida de hojas	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	Repetir durante el invierno.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.