



MANZANO PERALES

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Huertos en formación	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR o ZOBERAMINOL 80 sp	300 cc/100L 0,5 Kg/ha	Aplicar con brote de 20 cm. Repetir cada 10 a 15 días
	Crecimiento de Raíces	BIORADICANTE	5 L/ha	Aplicar vía riego con actividad radicular.
		ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
Yema hinchada	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	
Puntas Verdes	Corrección nutricional Estimular crecimiento	DEFENDER ZINC	0,5 L/ha	No mezclar con dodine o aceites. Repetir de ser necesario.
Botón rosado	Corrección nutricional favorecer cuaja	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	
	Crecimiento de raíces	BIORADICANTE	10 - 15 L/ha	Aplicar vía riego, en inicio de actividad radicular.
		ZOBERAMINOL RADICULAR	15 - 25 L/ha	
Inicio de flor	Mejorar cuaja y calidad de frutos	DEFENDER BORO	1 - 1,5 L/ha	Mezcla compatible con la mayoría de los productos.
	Mejorar calidad de frutos	DEFENDER CALCIO	3 - 4 L/ha	
	Aumentar el número de semillas por fruto	FRUTALIV	2 - 3 L/ha	
Caída de pétalos	Crecimiento de los frutos	VITALEM FORTE	4 - 6 L/ha	Aplicar a caída de pétalos, 20 y 40 días después.
	Control de bitter pit y mejorar la calidad de frutos	DEFENDER BORO	0,8 - 1 L/ha	Repetir en tres oportunidades
		DEFENDER CALCIO	2 - 4 L/ha	
Crecimiento de frutos (octubre-noviembre)	Bioestimulación general	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR o ZOBERAMINOL 80 sp	300 cc/100L 0,5 Kg/ha	Aplicar mojando bien todo el follaje. Recuperación de estrés.
	Corrección foliar	DEFENDER MG	2 - 4 L/ha	2 a 3 aplicaciones, alternadas con las de calcio
	Corrección nutricional, estimular crecimiento	DEFENDER ZINC	0,75 - 1 L/ha	
	Mejorar calidad de fruta. elicitación de fruta	KENDAL	3 - 4 L/ha	

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.



MANZANO PERALES

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Fruto formado (diciembre-enero)	Potenciar color y calidad de fruta.	DEFENDER POTASIO	3 - 5 L/ha	Aplicar a 60,45 y 30 días antes de cosecha o en fuji 80, 60 y 40 días antes de cosecha
	Corrección nutricional, estimular crecimiento	DEFENDER ZINC	0,75 L/ha	
	Estimular sanidad de la planta	FOSFIMAX 40-20	4,5 L/ha	Tratamiento ojo de buey; aplicar a 45, 30 y 15 días antes de cosecha
	Mejorar calidad de fruta. elicitación de fruta	KENDAL	3 - 5 L/ha	
Pre cosecha	Correccion foliar	DEFENDER MG	2 - 3 L/ha	Aplicar a los 30 y 15 días antes de cosecha para ojo de buey (neofabrea). En caso de phytophthora sp., Repetir en post cosecha
	Estimular sanidad de la planta	FOSFIMAX 40-20	4,5 L/ha	Aplicar a 45, 30 y 15 días antes de cosecha
Post cosecha	Correccion nutricional	DEFENDER BORO	1,5 L/ha	Aplicar en post cosecha temprana con hojas activas, mojando bien todo el follaje.
		DEFENDER ZINC	1 L/ha	
Caida de hojas	Control de enfermedades	HIDROCOB 77	3 kg/ha	Repetir durante el invierno.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.