



MELON Y SANDIA

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

EPOCA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Almácigo	Estimula la resistencia a caída de almácigos	FOSFIMAX 40-20	300 cc/100 L	Aplicar en forma preventiva con un par de hojas verdaderas, repetir a los 7-10 días.
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	300 - 400 cc/100 L	Aplicar con plántulas con primer par de hojas verdaderas, sobre suelo a capacidad de campo, repetir cada 7 días.
Transplante y establecimiento	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	1 - 2 L/ha	Aplicar 7 días post transplante y repetir cada 10 a 12 días.
	Estimula la resistencia a Tizón del cuello	FOSFIMAX 40-20	1 - 2 L/ha	Sistemia total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva cada 10 a 12 días. Curativo cada 7 a 10 días.
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	1 - 1,5 L/ha	Aplicar 7 días post transplante sobre suelo a capacidad de campo. Repetir cada 7 días.
Desarrollo vegetativo	Estimula la resistencia a Tizón del cuello	FOSFIMAX 40-20	1 - 2 L/ha	Sistemia total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva cada 10 a 12 días. Curativo cada 7 a 10 días.
	Control de <i>Alternaria cucumerina</i>	MASTERCOP	0,75 - 1 L/ha	Sistemia total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva cada 10 a 12 días. Curativo cada 7 a 10 días.
	Estimula la resistencia a oídio y otros hongos	KENDAL	1,5 - 2 L/ha	Sistemia ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 - 3 L/ha	Repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de fruto	VITALEM FORTE	0,5 - 1 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
Floración	Control de pudrición apical y firmeza de frutos	DEFENDER CALCIO	1,5 - 2 L/ha	Iniciar las aplicaciones en prefloración y repetir cada 10 a 12 días.
	Cuaja y calibre	FRUTALIV	1,5 - 2 L/ha	Aplicar al follaje con las primeras flores abiertas y repetir cada 10 a 12 días hasta término de floración.
Crecimiento de fruto	Control de <i>Alternaria cucumerina</i>	MASTERCOP	1 - 1,5 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Ante alta presión repetir a los 7 días.
	Estimula la resistencia a oídio y otros hongos	KENDAL	2 - 3 L/ha	Sistemia ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Cuaja y calibre	FRUTALIV	2 - 3 L/ha	Bioactivador a base de aminoácidos específicos y Pirofosfato. Aplicar durante el crecimiento inicial de los frutos, repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de fruto	VITALEM FORTE	1,5 - 2 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
	Color de pulpa y llenado de fruto	DEFENDER POTASIO	2 - 3 L/ha	Rápida absorción. Aplicar cada 15 a 20 días. Aplicar junto a acidificante como CONTROL DMP.
Retoño	Crecimiento de frutos	VITALEM FORTE	1,5 - 2 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
	Cuaja y calibre de frutos	FRUTALIV	1,5 - 2 L/ha	Aplicar al follaje con las primeras flores abiertas y repetir cada 10 a 12 días hasta término de floración.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.