



# PAPAS

## PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

ETAPA FENOLÓGICA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Crecimiento vegetativo	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>KENDAL</b>	3 - 4 L/ha	Sistemía ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Activar la fotosíntesis	<b>DEFENDER MAGNESIO</b>	2 - 3 L/ha	
	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	2 - 3 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
Inicio de la tuberculización	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>KENDAL</b>	3 - 4 L/ha	Sistemía ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Crecimiento vegetativo	<b>ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR</b>	2 - 3 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
Llenado del tubérculo	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 a 4 L/ha	Sistemía total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>KENDAL</b>	3 - 4 L/ha	Sistemía ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>ALFOSITOL</b>	0,6 - 0,8 L/ha	Iniciar aplicaciones cuando existan condiciones favorables a la enfermedad
	Mejora la calidad de guarda	<b>DEFENDER Boro</b>	2 L/ha	
	Mejora la calidad del Tubérculo	<b>DEFENDER Potasio</b>	2 - 4 L/ha	Aplicar 45 días antes de cosecha
Maduración del tubérculo	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>FOSFIMAX 40-20</b>	3 - 4 L/ha	Sistemía total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>KENDAL</b>	3 - 4 L/ha	Sistemía ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío	<b>ALFOSITOL</b>	0,6 - 0,8 L/ha	Iniciar aplicaciones cuando existan condiciones favorables a la enfermedad

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.