



TOMATE DETERMINADO

PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL

ETAPA FENOLÓGICA	OBJETIVO	PRODUCTO	DOSIS	OBSERVACIONES
Almácigo	Estimula la resistencia a caída de almacigos	FOSFIMAX 40-20	300 cc/100 L	Aplicar en forma preventiva, repetir a los 7-10 días.
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	300 a 400 cc/100 L	Aplicar con plántulas con 1er par de hojas verdaderas, sobre suleo a capacidad de campo, repetir cada 7 días.
Transplante y establecimiento	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	300 cc/100 L	Aplicar 7 días post transplante y repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de Raíces	ZOBERAMINOL RADICULAR	1 a 1,5 L/ha	Aplicar con plántulas con 1er par de hojas verdaderas, sobre suleo a capacidad de campo, repetir cada 7 días.
Desarrollo vegetativo	Estimula la resistencia a Tizón tardío	FOSFIMAX 40-20	1 a 2 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío y otros hongos	KENDAL	1,5 a 2 L/ha	Sistemia ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Control de Tizón tardío Tizón temprano Cancro bacteriano y Pseudomonas spp.	MASTERCOP	0,75 a 1 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad, repetir a los 7 días.
	Crecimiento vegetativo	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR	2 a 3 L/ha	Aplicar cada 10 a 12 días.
Floración	Control de pudrición apical y firmeza de frutos	DEFENDER CALCIO	1,5 a 2 L/ha	Iniciar las aplicaciones en prefloración y repetir cada 7 días.
	Cuaja y calibre	FRUTALIV	2 a 3 L/ha	Aplicar al follaje con las primeras flores abiertas y repetir cada 12 a 15 días hasta término de floración.
Desarrollo vegetativo	Estimula la resistencia a Tizón tardío	FOSFIMAX 40-20	2 a 3 L/ha	Sistemia total dentro la planta. Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad. Preventivo cada 10 12 días. Curativo cada 7 días.
	Estimula la resistencia a Tizón tardío y otros hongos	KENDAL	2 a 3 L/ha	Sistemia ascendente y descendente. Prevención y control. Su uso permite bajar a la mitad la dosis de otros fungicidas.
	Control de Tizón tardío Tizón temprano Cancro bacteriano y Pseudomonas spp.	MASTERCOP	1 a 1,5 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas visuales de la enfermedad, repetir a los 7 días.
	Cuaja y calibre	FRUTALIV	2 a 3 L/ha	Aplicar durante el crecimiento inicial de los frutos, repetir cada 10 a 12 días.
	Crecimiento de fruto	VITALEM FORTE	1,5 a 2 L/ha	Aplicar cada 10 12 días.
	Color de frutos	DEFENDER Potasio	2 a 3 L/ha	Rápida absorción. Aplicar cada 15 a 20 días. Aplicar junto a acidificante como CONTROL DMP.

- Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
- Lea cuidadosamente toda la etiqueta antes de usarlo.