

FERTIDRY® CALCIO WDG

Nombre comercial	FERTIDRY CALCIO WDG
Grupo	Fertilizante
Tipo	Bioestimulante
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)
Nitrógeno Total (N)	9,7
Carbono Total (C)	32,5
CaO	14,1
L-Aminoácidos Libres	29
L-Aminoácidos Totales	60,6

Densidad volumétrica: 348 g/L
pH 1,0 %: 11,4

Formulación	Gránulos dispersables en agua (WDG)
Modo de Acción	Absorción foliar y radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FERTIDRY CALCIO WDG es un bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos junto con Calcio en una formulación de gránulos dispersables (WG) que se disuelven fácilmente en agua para su posterior aplicación. FERTIDRY CALCIO WDG estimula la planta de forma natural, liberándola de situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad. El calcio mejora la calidad y firmeza de los frutos y es muy importante en el crecimiento de la raíz.

FERTIDRY CALCIO WDG en mezclas con fitosanitarios, potencia su eficiencia e incrementa los beneficios de los extractos de alga.



FERTIDRY® CALCIO WDG

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Dosis Kg/ha	Concentr. gr/100L
Uva de Mesa	2-3 aplicaciones en crecimiento de baya.	1,5 - 2,5	150 - 200
Uva Vinífera y Pisquera	2-3 aplicaciones en crecimiento de baya.		
Cítricos, Paltos	En floración, cuaje y crecimiento de los frutos.		
Cerezos, Almendros, Durazneros y Nectarines	En floración, cuaje y crecimiento de los frutos.		
Manzanos, Perales, Nogal, Avellano	En floración y crecimiento de los frutos.		
Kiwis	En floración y crecimiento inicial de frutos.		
Arándano, Frambuesa y Frutilla.	En floración, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Coliflor, Brócoli	Desde 6 hojas, cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.	1,0 - 1,5	
Papa	2-3 aplicaciones durante el período de llenado de los tubérculos.		
Apio, Lechuga, Acelga, Espinaca	Desde transplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.		
Tomate, Pimentón.	Desde transplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.		
Melón y Sandía	2 aplicaciones antes de floración y 2 en el crecimiento de los frutos. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas		

Aplicar vía riego: 2-4kg/ha en Hortalizas, Cultivos y Berries, 4-6kg/ha en Frutales

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD


Aplicar vía foliar, utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de goteo. FERTIDRY CALCIO WDG es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases: 1 Kg



www.bioamerica.cl

Oficina Central: +562 2350 7400 - info@bioamerica.cl