

# FERTIDRY® MAGNESIO WDG

<b>Nombre comercial</b>	FERTIDRY MAGNESIO WDG
<b>Grupo</b>	Fertilizante
<b>Tipo</b>	Bioestimulante
<b>Grado</b>	Agrícola
<b>Comercializado por</b>	Bioamerica® S.A.

## COMPOSICIÓN


INGREDIENTE	%(p/p)
Nitrógeno Total (N)	7,2
Carbono Total (C)	22,9
Magnesio (MgO)	11,2
L-Aminoácidos Libres	14,5
L-Aminoácidos Totales	49,2
Calcio (CaO)	0,26

Densidad volumétrica: 365 g/L  
pH 1,0 %: 4,35

<b>Formulación</b>	Gránulos dispersables en agua (WDG)
<b>Modo de Acción</b>	Absorción foliar y radicular

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FERTIDRY MAGNESIO WDG es un bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos junto con Magnesio en una formulación de gránulos dispersables que se disuelven fácilmente en agua para su posterior aplicación. FERTIDRY MAGNESIO WDG estimula la planta de forma natural, liberándola de situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad. El Magnesio es necesario para la fotosíntesis y clave en la firmeza de los frutos. FERTIDRY MAGNESIO WDG en mezclas con fitosanitarios, potencia su eficiencia e incrementa los beneficios de los extractos de alga.



# FERTIDRY® MAGNESIO WDG

## RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Dosis Kg/ha	Concentr. gr/100L
Uva de Mesa	Desde brotes de 10-20 cm. En crecimiento de bayas hasta inicio de ablande.	1,5 - 2,5	150 - 200
Uva Vinífera y Pisquera	Desde brotes de 10-20 cm. En crecimiento de bayas hasta inicio de ablande.		
Cítricos, Paltos	Junto a los crecimientos de brotes de primavera y otoño.		
Cerezos, Almendros, Durazneros y Nectarines	En crecimiento de los brotes. En postcosecha temprana.		
Manzanos, Perales, Nogal, Avellano	En crecimiento de los brotes. En postcosecha temprana.		
Kiwis	Desde brotes de 10-20 cm.		
Arándano, Frambuesa y Frutilla	En crecimiento de los brotes. En postcosecha temprana.	1,0 - 1,5	150 - 200
Coliflor, Brócoli	Desde 6 hojas, cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por bajas temperaturas.		
Papa	2-3 aplicaciones durante el período de crecimiento de los brotes.		
Apio, Lechuga, Acelga, Espinaca	Desde trasplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por bajas temperaturas.		
Tomate, Pimentón.	Desde trasplante, repetir cada 10-15 días. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por altas o bajas temperaturas.		
Melón y Sandía	2 aplicaciones antes de floración. Repetir a los 5-7 días en períodos de estrés por bajas temperaturas.		

Dosis vía riego: 2-4kg/Ha en Hortalizas, Cultivos y Berries, 4-6 kg/Ha en Frutales

## APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD


Aplicar vía foliar, utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de goteo. FERTIDRY MAGNESIO WDG es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales.

## ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

## PRESENTACIÓN

Envases: 1 Kg



[www.bioamerica.cl](http://www.bioamerica.cl)

Oficina Central: +562 2350 7400 - [info@bioamerica.cl](mailto:info@bioamerica.cl)