

Fósforo procedente del anión
fosfito

FOSFIMAX 40-20

ELEMENTOS	% p/p	% p/v
Fósforo (P_2O_5) *	40,0	59,6
Potasio (K_2O)	20,0	29,8

Solubilidad a 20°C: 100%
pH (solución al 1%): 2,25
Densidad (g/ml): 1,49

* Fósforo equivalente a 639 g/L de fosfito.

CONTENIDO EN METALES PESADOS:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 10 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg;
Arsénico(As) ≤ 50 mg/kg.

CONTENIDO: 20l
BOAMERICA

FÓSFORO PROCEDENTE DEL ANIÓN FOSFITO

CARACTERÍSTICAS:

FOSFIMAX 40-20 es una solución de fósforo y potasio, en la que todo el fósforo procede del anión fosfito. Se transloca tanto en sentido ascendente como descendente y se acumula principalmente en las zonas dañadas por agentes infecciosos, recuperando y fortaleciendo la planta. El fósforo de **FOSFIMAX 40-20** se encuentra en forma reducida (H_2PO_3), activando los mecanismos de las plantas, revitalizándolas y haciéndolas resistentes. La elevada riqueza en fósforo hace de **FOSFIMAX 40-20** un producto idóneo para su empleo durante todo el ciclo de cultivo y particularmente para los momentos de fructificación por su elevada concentración en potasio.

FOSFIMAX
40-20

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100l	OBSERVACIONES	
Cítricos	3,0-5,0	200-300	Iniciar las aplicaciones si las condiciones son favorables, cada 20 a 30 días.	
Carozos, Cerezos, Pomáceas				
Paltos	6,0-10,0	120-150	Aplicar al menos dos veces por cada flush de crecimiento radicular o durante el ciclo completo del cultivo.	
Nogal	3,0-4,0			
Frambuesa, Arándano, Frutilla	2,0-4,0	200-300	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12 a 15 días.	
Uva, Kiwis	3,0-5,0		Aplicar 45, 30 y 15 días de cosecha y/o después de cada lluvia.	
Manzano	3,0-5,0		Desde plantas con 30 cm de altura.	
Papa	3,0-4,0	400-500	Aplicar en almaciguera desde 2 hojas verdaderas, al trasplante y repetir cada 7 a 10 días. Con presencia de la enfermedad cada 7 a 10 días.	
Cebolla, Ajo	1,0-3,0		400-500	Desde 3 - 4 hojas.
Tomate, Pimiento Melón, Sandía, Zapallo, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga				
Maiz	1,0-1,5			

Se aplica durante todo el ciclo de cultivo, especialmente en los momentos en que las plantas se encuentran debilitadas.

COMPATIBILIDADES:

FOSFIMAX 40-20 es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con hidróxidos de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y productos cúpricos. No obstante, puede ser aplicado una semana antes o tres después del empleo de aceites o fungicidas cúpricos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Lavarse las manos después de la aplicación.
Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20l

FABRICADO POR:



FUTURECO
bioscience

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadi, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

IMPORTADOR:

BIOAMERICA

BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl