

FOSFIMAX® ZINC

Grupo: Fosfitos

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Previene y corrige carencias de Zinc en el tejido vegetal
- ✓ Revitaliza plantas debilitadas
- ✓ Recupera a la planta ante condiciones de estrés biótico

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Fósforo (P ₂ O ₅)	20	24
Zinc (Zn)	5	6


Densidad a 20 °C: 1,2 g/ml
pH al 0,2% a 20°C: 2,8
Solubilidad a 20°C: 100%

Formulación Concentrado soluble - SL
Modo de Acción Absorción foliar y radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FOSFIMAX ZINC es un fosfito líquido en base a Fósforo y Zinc. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de revitalizar a la planta ante situaciones de estrés biótico. Además, de prevenir y corregir carencias de Zinc en Frutales y Cultivos. El Fósforo que contiene FOSFIMAX ZINC procede del anión fosfito y se encuentra en forma reducida (H₂PO₃), esto hace efectiva la activación del metabolismo vegetal que permite revitalizar y asegurar un mejor desarrollo en plantas debilitadas. El uso de FOSFIMAX ZINC es ideal durante todo el ciclo de cultivo, particularmente en los momentos de mayor demanda del elemento Zinc. Las moléculas activas son rápidamente absorbidas por el follaje y es trasladado en forma sistémica dentro de la planta, asegurando su alcance hacia brotes, frutos y raíces.


FOSFIMAX ZINC tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos sobre los órganos aplicados y el 100% del Fósforo y Zinc vienen disponibles para el aprovechamiento de la planta.



FOSFIMAX® ZINC

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTR. cc/100 l	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa, Uva vinífera y Kiwis	100 - 150	Desde prefloración, repetir cada 15 a 20 días
Manzanos y Perales		En prefloración, cuajado y desarrollo de frutos
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros		En postcosecha temprana, repetir a los 20 días
Nogales y Avellanos	50	Desde fines de verano, repetir cada 15 a 20 días
Paltos, Naranjos, Mandarinos y Limones	100 - 150	
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		En postcosecha temprana, repetir a los 20 días
Tomate, Pimiento y Pepino	100 - 150	Durante el desarrollo del cultivo, repetir cada 15 a 20 días
Melón, Sandía y Zapallo		
Cebolla y Ajo		
Apio, Lechuga y Espinaca		
Coliflor y Brócoli		
Papa	300	Durante el desarrollo del cultivo, repartir un mínimo de 4 aplicaciones
Trigo, Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas		



FOSFIMAX® ZINC

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

FOSFIMAX ZINC se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas. También se puede aplicar vía riego.

FOSFIMAX ZINC es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. No se debe mezclar con productos cálcicos, Dicofol, Dimetoato, Aceites ni Cobres. Se recomienda evitar las mezclas con productos formulados como emulsiones concentradas. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 l

